

Отчет Медцентр (РАДА) г Ярославль

Женщина 28 лет обратилась с жалобами на неустойчивое настроение плаксивость.слабость в конечностях на улицу одна выходить не может.дома передвигается держась за стенки. Головную боль. Ухудшение зрения – не может читать – видит все расплывчато. Запоры,

Наблюдается у невропатолога с диагнозом рассеянный склероз в течение 2 х лет. Периодически принимает сосудистые препараты

Проводилась диагностика по методу Фолля и вегетативно-резонансному тесту на аппаратуре АПК Имедис-тест

По методу Фолля выявлено снижение показателей по всем меридианам в интервале от 8 ед до 20 при норме 50 ед

По ВРТ тестировались частоты вирусов простого герпеса тип 1

Вирус ветряной оспы

Коксаки 2.7.9

Вирус полиомиелита

Нозод множественного рассеянного склероза

1 курс

Назначены программы на приборе Дета РИТМ

Дисбактериоз . Регуляция ЖКТ через день утром

Печень Почки через день вечером согласно активности меридианов
Антистресс ежедневно

Эссенциале форте 1 капс 2 раза в день во время еды

Этот курс проводился в течение месяца

При повторном приеме пациентка отмечала улучшение настроения – меньше плакала. Отметила уменьшение головных болей

2 курс

На приборе Дета РИТМ

Выставлены программы – Антистресс – ежедневно

ВСД. Регуляция ЖКТ чередовать утром

Рассеянный склероз - днем

Гепатотоксемический синдром. Холецистит - вечером

На приборе Дета АР

Вирус коксаки общий ежедневно Детокс ежедневно

Рассеянный склероз инфекции. Рассеянный склероз токсический чередовать
Программы проводились в течение 10 дней затем 4 дня перерыв. Еще 10
дней- 8 дней перерыв. Еще 10 дней – 12 дней перерыв

3 курс

На приборе АР

Вирус коксаки 2.4.5.6

Колли мутант

Лимфа и детокс ежедневно утром

Рассеянный склероз токсическая и инфекционная нагрузка днем

На приборе Ритм

Запор утром

Пиелонефрит вечером в течение 10 дней - дня перерыв

Затем на Дета АР

Герпес зостер

Герпес симплекс ти 2

Герпес зостер вторичный

Лимфа и детокс ежедневно утром

Расс скл инфекция головного мозга днем

На Дета Ритм

Запор утром

Пиелонефрит с 15 до 19 ч

Холецистит 21-22 ч в течение 10 дней

Через 3 дня перерыва

На Дета АР

Герпес симплекс 1\2

Симплекс 2

Рассеянный склероз вторичный -2

На Д-Ритм

Холецистит Пиелонефрит по времени активности печени и почек ежедневно

Очистка плазмы крови

В течение 10 дней

Через 3 дня перерыва

РС токсические и инфекционные нагрузки

РС инфекции головного мозга

РС вторичный программы чередовать

Запор ежедневно вечером

